

Tensolv[®]

5.000

I.E./100g

gel
FÜR
PFERDE

Zulassungsinhaber

Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH
Hauptstr. 6 – 8, 88326 Aulendorf

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller
Genera Inc., Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica,
10436 Rakov Potok, Kroatien

Bezeichnung des Tierarzneimittels

Tensolv[®] 5.000 I.E. / 100 g Gel für Pferde

Wirkstoffe und sonstige Bestandteile

100 g Gel enthalten:

Wirkstoffe: Heparin-Natrium (Mucosa)

WHO-Standard 5000 I.E.

entsprechen 0,031-0,042* g

Levomenthol 0,5 g, (2-Hydroxyethyl)-salicylat 5,0 g

* basierend auf einem Gehalt von 120-160 I.E.
Heparin-Natrium pro mg

Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von lokalen, entzündlichen Schwellungen und Prellungen, inklusive Tendinitis (Sehnenentzündung), Tendosynovitis (Sehnenscheidenentzündung), Bursitis (Schleimbeutelentzündung) und anderen akuten, entzündlichen Erkrankungen des Bewegungsapparates beim Pferd. Tensolv[®] fördert darüber hinaus die frühzeitige Resorption von Blutergüssen und ödematösen Schwellungen in Zusammenhang mit den vorgenannten Erkrankungen.

Gegenanzeigen: Stuten, von denen Milch als Lebensmittel gewonnen werden soll, sind von der Anwendung auszuschließen. Tensolv[®] soll nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierart: Pferd

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung: Das Gel wird nach tierärztlicher Anweisung bis zum Abklingen der krankhaften Erscheinungen bis zu einer Gesamtmenge von 50 g pro Tag einmassiert.

Wartezeit: Essbares Gewebe: 0 Tage

Stuten, von denen Milch als Lebensmittel gewonnen werden soll, sind von der Anwendung auszuschließen.

Besondere Lagerungshinweise: Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Besondere Warnhinweise:

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren: Nicht in die Augen oder auf Schleimhäute bringen. Nicht auf offene oder frische bzw. verschorfte Hautläsionen auftragen. Bei erkennbaren Reaktionen im Auftragsbereich Anwendung sofort beenden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender: Nicht in die Augen oder auf Schleimhäute oder offene Wunden bringen.

Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode: Zur topischen Anwendung von Tensolv[®] 5.000 I.E./100 g während der Trächtigkeit liegen keine Erfahrungen vor. Die Anwendung von Tensolv[®] 5.000 I.E./100 g während der Trächtigkeit wird nicht empfohlen.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen und Gegenmittel): Bei bestimmungsgemäßer topischer Anwendung ist keine Überdosierung bekannt.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich: Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Genehmigungsdatum: 07.05.2018

Für Tiere. Apothekenpflichtig Zul.-Nr. 880.00.00

Ch.-B.:

verwendbar bis:

713170-0919


Dechra